

Les différents types de préservatifs





Les préservatifs sont les seuls modes de prévention et de protection contre les **Infections Sexuellement Transmissibles (IST)**. Avant toute utilisation, vérifier :

- que l'emballage n'est pas abîmé ;
- qu'il s'agit d'une norme française (NF) ou Communauté Européenne (CE) ;
- et que la date de péremption n'est pas dépassée.

Préservatif féminin / interne



Avantages


- La personne maîtrise sa protection ;
- Peut être placé 4h avant un rapport sexuel ;
- Confort lié à la lubrification au silicone ;
- Résistance accrue (2 fois plus que le latex) ;
- Possibilité de recourir à n'importe quel lubrifiant ;
- Très confortable si allergie au latex ;
- Protège des IST et des grossesses.

Inconvénients

- Certaines difficultés peuvent être liées à son insertion dans le vagin les 2-3 premières fois.

Son prix

Plus ou moins 2 € en pharmacie, certaines marques sont gratuites pour les moins de 26 ans.



Comment mettre un préservatif féminin / interne

Préservatif masculin / externe



Avantages

- Existe différentes sortes (plus grands, plus fins, aromatisés, colorés, etc.) en fonction des pratiques sexuelles ;
- Existe également en modèle hypoallergénique et en polyuréthane (sans latex) ;
- Peut être remboursé sur ordonnance médicale ;
- Protège des IST et des grossesses.

Inconvénients

- Doit être mis dès le début de l'érection ;
- Doit être retiré avant la fin de l'érection en le tenant par son ouverture ;
- Doit être changé à chaque rapport sexuel ;
- Pour les préservatifs en latex, lubrifiant uniquement à base d'eau.

Son prix

0,20 € environ le préservatif en pharmacie, certaines marques sont gratuites pour les moins de 26 ans (EDEN®, Sortez couverts®).



Un préservatif interne ne doit jamais être utilisé en même temps qu'un préservatif externe, pour éviter tout risque de rupture.
En cas de problème avec un préservatif, pensez à la **contraception d'urgence**.*

* Contraception d'urgence : 2 méthodes sont possibles. La 1^{re} est la « pilule du lendemain » et la 2nd le dispositif intra-utérin au cuivre (stérilet).
La contraception d'urgence doit être utilisée le plus rapidement possible après un rapport à risque et jusqu'à 5 jours après.



Centre de Santé Sexuelle et d'IVG
Flora Tristan
service de Gynécologie obstétrique
pôle Femme - Mère - Enfant

Quartier Rose, Bât. F4 - Flora Tristan,
4 rue Larrey - 49933 Angers Cedex 9

Secrétariat du centre
Tél : 02.41.35.38.43

Dr E. LAVIGNE - Praticien hospitalier,
médecin responsable de l'unité

Pour plus d'information sur le Centre de Santé Sexuelle et
d'IVG Flora Tristan :

www.chu-angers.fr/centrefloratristan