

INFECTION À *CLOSTRIDIUM DIFFICILE* (ICD)

Précautions complémentaires CONTACT SPECIFIQUE

Le *Clostridium difficile* (CD) est une bactérie responsable d'infection digestive, à contamination par voie **oro-fécale**.

La transmission de personne à personne se fait par contact direct (manuportage) avec un patient infecté ou par contact indirect avec l'environnement contaminé. Seules les souches toxigènes de *C. difficile* sont pathogènes.

Recommandations aux soignants et aux intervenants externes

Lavage des mains obligatoire pour éliminer les spores (SHA inactive).

Surblouse à manches longues dès l'entrée de la chambre + tablier plastique à UU si soins mouillants ou souillants.

Port des gants dès l'entrée dans la chambre, à renouveler entre deux soins, à retirer avant la sortie de la chambre, suivi d'un lavage des mains et d'une friction SHA

Gestion des excréta : Évacuer rapidement les selles. Éliminer les protections en DASRI ou acheminer le bassin avec couvercle au lave-bassin (LB). À défaut de LB utiliser des sachets protecteurs de bassin et/ou de chaise percée et désinfecter le bassin entre 2 usages.

Organisation

Ne pas transférer le résident symptomatique et limiter les visites

Privilégier le matériel à usage unique et individualiser le matériel réutilisable. À défaut, nettoyer et désinfecter ce matériel réutilisable en sortant de la chambre

Entretien surface et locaux

Surfaces et sols : réaliser au minimum 1 fois par jour l'entretien avec un détergent-désinfectant sporicide ou un nettoyage complet (déterSION, rinçage) suivi d'une désinfection à l'eau de Javel à 0,5 % de chlore actif. (1l d'eau de javel à 2.6% ou 1 berlingot à 9.6% de chlore actif pour un seau de 5l)

- Insister sur tous les objets relais : barrières, interrupteurs poignée de porte...

Gestion du linge et des déchets

Conditionner le linge en emballage étanche, hydrosoluble. Si linge pris en charge par un prestataire, se référer à ses exigences. Ne pas le stocker dans la chambre.

Pour le linge repris par la famille, le mettre immédiatement dans un sac en plastique fermé pour éviter toute manipulation et à laver à part rapidement,

Éliminer tous les déchets en DASRI y compris les produits d'incontinence.

Information aux résident

Arrêter les activités du résident malade pendant la phase diarrhéique.

Lui demander de se laver les mains après passage aux toilettes

Lever l'isolement 48 à 72 heures après la disparition des diarrhées

Recommandations aux visiteurs

Limiter les visites.

Ne pas s'asseoir sur le lit, ne pas utiliser les toilettes du patient.

Lavage simple des mains obligatoire à la sortie de la chambre.

Suivi d'une friction

Recherche étiologique

Réaliser un prélèvement de selles avec demande de recherche de toxines de *Clostridium difficile* par le laboratoire habituel (recherche non comprise dans une coproculture)

Infection à *Clostridium difficile* (Tableau récapitulatif)

Chambre individuelle	Prévoir une signalétique et guéridon, ou échelle d'isolement
Hygiène des mains	Pour les professionnels: Avant de sortir de la chambre retirer les équipements de protection individuelle (gants, tablier à usage unique) et faire un lavage des mains, eau et savon, suivi d'une friction à la solution hydro alcoolique après séchage des mains. Pour le résident: Lavage simple des mains après être allé aux toilettes et avant la sortie de chambre
Port des EPI gants et tablier plastique à usage unique	Mettre dès l'entrée de la chambre les gants et tablier, rajouter un tablier plastique pour les soins mouillants souillants. Retirer les EPI avant de sortir de la chambre
Déchets	Sac DASRI pour l'ensemble des déchets y compris les changes, à fermer dans la chambre pour retrait rapide
Entretien de l'environnement	Nettoyer quotidiennement avec un détergent, laisser sécher et rincer. En l'absence de produit sporicide, désinfecter à l'eau de Javel à 0,5% de chlore actif, laisser sécher.
Matériel de soin	Individualiser le matériel de soin (Stéto, brassard TA, thermomètre) Désinfecter après utilisation Si utilisation de bassin, urinal, montauban, prévoir l'emploi de sac protecteur
Visiteurs	Lavage simple des mains à l'eau et savon avant de quitter la chambre Ne pas utiliser les toilettes du résident

Si besoin, faire appel au RTH Anjelin au 02.41.35.49.36 ou reseau-anjelin@chu-angers.fr