



Anjou Eviction Lutte contre les Infections Nosocomiales
Relai Territorial en Hygiène 49



Et si on s'équipait...

	SHA*	Tablier	gants	Surblouse
Bionettoyage	X	X	X	
Gestion des excréta	X	X	X	
Exposition liquides biologiques lors de la toilette	X	X	X	
Résident porteur d'une BMR ou 1 BHRe	X	X	X	
Tri du linge	X	X	X	
Précaution spécifique Gale ou <i>Clostridium difficile</i>	X	X	X	X

*SHA : Faire 1 friction avant de prendre un EPI

Faire 1 friction immédiatement après le retrait de l'EPI

Porter des gants uniquement :

- en cas de risque d'exposition au sang ou tout autre produit biologique d'origine humaine, de contact avec une muqueuse ou la peau lésée,
- les piquants/tranchants
- lors des soins si les mains du soignant comportent des lésions cutanées.

Mettre les EPI au plus près du soin, et les éliminer immédiatement à la fin de la séquence de soins

Porter un tablier imperméable à usage unique lors de tout soin souillant ou mouillant ou exposant à un risque de projection ou d'aérosolisation de produit biologique d'origine humaine.

Les équipements de protection individuelle (EPI) désignent les mesures barrières suivantes : port de gants, protection de la tenue, protection du visage (masque/lunettes),

Utilisés seuls ou en association, ils protègent du risque d'exposition à des micro-organismes.

E effectuer une hygiène des mains :

1. avant un contact avec le patient,
2. avant un geste aseptique,
3. après un risque d'exposition à un produit biologique d'origine humaine,
4. après un contact avec le patient,
5. après un contact avec l'environnement du patient.

Changer de gants :

- entre deux patients,
- pour un même patient lorsque l'on passe d'un site contaminé à un site propre.



Best of

